

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccine Q&A

Did you know? Children ages 11–12 years should get two doses of HPV vaccine, given 6 to 12 months apart. The vaccine protects against cancers caused by HPV infections. If you wait until age 15, your child will need 3 doses. If your child isn't vaccinated yet, talk to their primary care provider as soon as possible.



Q: Is HPV rare?

A: No. Nearly everyone will get some form of HPV at some point in their lives. Vaccinating 11-12 year olds can protect them before they are exposed to those forms of HPV that cause cancers.

Q: Don't only girls get HPV?

A: No. HPV is well known for causing cervical cancer in girls, however, HPV can also lead to cancers of the penis, anus, and back of the throat for men. The best way to prevent HPV infection is to be vaccinated. That is why it is important that all children be vaccinated against HPV.

Q: Does my child only need the vaccine if they are sexually active?

A: No. The vaccine works by protecting the body from the virus before it comes in contact with the virus. It only protects from the strains that you haven't been exposed to yet. Therefore, it's recommended that children be vaccinated before they become sexually active.

Q: Does the vaccine promote sexual activity?

A: No. The HPV vaccine is safe and does not make kids more likely to have sex.

Q: Does my child need more than one shot of the HPV vaccine?

A: Yes. Children need to get more than one shot of the HPV vaccine given over six months. It works best when you get all of the shots on schedule.

Q: Does the vaccine even work?

A: Yes. The HPV vaccine works very well. Studies show that the HPV vaccine works very well to prevent high-risk HPV and the problems it can cause. The HPV vaccine can prevent new HPV infections but does not treat existing HPV infections or diseases.

Preguntas y Respuestas Sobre la Vacuna Contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

¿Sabía usted? Los niños de 11 a 12 años deben recibir dos dosis de la vacuna contra el VPH, con un intervalo de 6 a 12 meses. La vacuna protege contra los cánceres causados por infecciones por VPH. Si espera hasta los 15 años, su adolescente necesitará 3 dosis. Si su adolescente aún no está vacunado, hable con su proveedor de atención primaria lo antes posible.



P: ¿Es raro el VPH?

R: No. Casi todas las personas contraerán algún tipo de VPH en algún momento de sus vidas. Vacunar a los niños de 11 a 12 años puede protegerlos antes de que se expongan a las formas de VPH que causan cáncer.

P: ¿No solo las niñas contraen el VPH?

R: No. Aunque el VPH es bien conocido por causar cáncer de cuello uterino en las niñas, el VPH también puede causar cáncer de pene, ano y parte posterior de la garganta en los hombres. La mejor manera de prevenir la infección por VPH es vacunarse. Por eso es importante que todos los niños estén vacunados contra el VPH.

P: ¿Mi hijo solo necesita la vacuna si está sexualmente activo?

R: No. La vacuna actúa protegiendo al cuerpo del virus antes de que entre en contacto con el virus. Solo protege de las cepas a las que aún no se ha expuesto. Por lo tanto, se recomienda que los niños sean vacunados antes de que estén sexualmente activos.

P: ¿La vacuna promueve la actividad sexual?

R: No. La vacuna contra el VPH es segura y no hace que los niños sean más propensos a tener relaciones sexuales.

P: ¿Mi hijo necesita más de una inyección de la vacuna contra el VPH?

R: Sí. Los niños necesitan recibir más de una inyección de la vacuna contra el VPH durante seis meses. Funciona mejor cuando reciben todas las inyecciones en la fecha prevista.

P: ¿Funciona la vacuna?

R: Sí. La vacuna contra el VPH funciona muy bien. Los estudios muestran que la vacuna contra el VPH funciona muy bien para prevenir el VPH de alto riesgo y los problemas que puede causar. La vacuna contra el VPH puede prevenir nuevas infecciones por VPH, pero no trata las infecciones o enfermedades de VPH existentes.